LE CANCER DU COL UTERIN

APPORT DE L'IMAGERIE

10 juin 2010

1

INTRODUCTION

- Extension locale des cancers du col
 - Col lui-même, **culs de sacs vaginaux**
 - Occasionnellement **isthme** et **corps utérin**
 - Dans les stades évolués, **paramètres**, **paroi vésicale**, et **paroi pelvienne**
 - **Paroi rectale** beaucoup moins fréquemment atteinte

10 juin 2010

2

INTRODUCTION

- Envahissement ganglionnaire
 - **relativement fréquent**, plus ou moins précoce
- Métastases à distance :
 - en général, **tardives** et inconstantes

10 juin 2010

3

APPORT DE L'IMAGERIE

- L'imagerie trouve sa place dans le cadre du bilan d'extension **locorégional** et à **distance**

10 juin 2010

4

APPORT DE L'IMAGERIE

- Le bilan préthérapeutique doit être fait de façon multidisciplinaire, incluant au minimum un chirurgien spécialisé et un radiothérapeute, quel que soit le stade initial

10 juin 2010

5

APPORT DE L'IMAGERIE

- **BILAN D'EXTENSION**, préciser les principaux facteurs pronostics et éventuellement influencer la stratégie thérapeutique:
 - l'extension dans le myomètre
 - l'extension aux paramètres
 - l'extension vaginale
 - l'extension à la paroi pelvienne
 - l'extension vésicale
 - l'extension rectale
 - l'atteinte ganglionnaire
 - la présence de métastases à distance

10 juin 2010

6

APPORT DE L'IMAGERIE

- La visualisation de l'appareil urinaire est obligatoire
 - urographie intraveineuse ou
 - clichés d'urographie post-scanner ou
 - **échographie rénale et vésicale** ou
 - tomodensitométrie ou
 - **imagerie par résonance magnétique [SOR 1997]**

10 juin 2010

7

APPORT DE L'IMAGERIE

- **Bilan local** par échographie sus-pubienne puis endocavitaire
- **imagerie par résonance magnétique : extension loco-régionale**

10 juin 2010

8

APPORT DE L'IMAGERIE

- **BILAN LOCO-REGIONAL**
 - IRM examen le plus fiable pour évaluer l'extension loco-régionale et la stadification préopératoire du cancer du col [Ozsarlak 2003], [Hricak 1996] [Kim 1990]
 - L'IRM est plus fiable que l'échographie (y compris EEV), le scanner et l'examen clinique
 - Pour évaluer l'atteinte ganglionnaire, IRM et scanner ont performances équivalentes [Hricak 1996]

10 juin 2010

9

APPORT DE L'IMAGERIE

- **Préparation :**
 - Pose d'une voie veineuse, injection dynamique
 - Opacification vaginale
 - Antenne jusqu'au hile rénal (étude ganglionnaire)
- **Séquences :**
 - 3 plans T2 (dont un plan perpendiculaire au col)
 - 3D isotropique T1
 - Sagittal T1 dynamique sans saturation de graisse (ou plan perpendiculaire au col)
 - 3D isotropique T1 tardif en saturation de graisse
 - T2 rapide : étude ganglionnaire jusqu'au hile rénal

10 juin 2010

10

Interêt clinique : Adaptation de la prise en charge thérapeutique

- **Taille tumorale** : en tenant compte de l'atteinte vaginale
- **Extension loco-régionale** :
Radiothérapie +++
 - Meilleure définition des volumes cibles pour la radiothérapie conformationnelle
 - Meilleure définition des volumes cibles pour la curie-thérapie

10 juin 2010

11

10 juin 2010

12

APPORT DE L'IMAGERIE

- L'aspect de la lésion
 - **En pondération T1,**
 - **signal identique** au reste de l'utérus (seule la déformation du col par la tumeur est visible) [Togashi 1989],
 - parfois **hypersignal modéré** (hémorragie récente) [Bartoli 1990]
 - **En pondération T2,**
 - **hypersignal**, interrompant le bas signal physiologique du col utérin [Hricak 1988]

10 juin 2010

14

APPORT DE L'IMAGERIE

- L'aspect de la lésion
 - **Après injection de gadolinium,**
 - **rehaussement modéré**, proche du stroma cervical normal [Yamashita 1992]
 - **Les études dynamiques**
 - **meilleur contraste** entre le stroma cervical et la tumeur est obtenu **entre la 30^{ème} et la 60^{ème} seconde**
 - puis décroît de manière rapide dès la 90^{ème} seconde [Yamashita 1992]

10 juin 2010

15

Bilan loco-régional: stade FIGO

- **Stade 0 de la FIGO: Carcinome intra épithélial**
 - Pas d'indication de bilan d'extension, pas de lésion visible en IRM.

10 juin 2010

16

Bilan loco-régional: stade FIGO

- **Stade I de la FIGO : Carcinome strictement limité au col utérin**
 - Stade IA : carcinome pré-clinique
 - Stade IA1: invasion microscopique ≤ 3 mm en profondeur, ≤ 7 mm en largeur
 - Stade IA2: invasion microscopique ≤ 5 mm en profondeur, ≤ 7 mm en largeur
 - Stade IB : lésion > IA2 vue cliniquement ou non
 - Stade IB1 ≤ 4 cm
 - Stade IB2 > 4 cm

10 juin 2010

17

Bilan loco-régional: stade FIGO

- **Stade I de la FIGO : Carcinome strictement limité au col utérin**
 - Stade IA : carcinome pré-clinique
 - Généralement **non visualisés en IRM** quelle que soit la séquence utilisée
 - Stade IB : lésion > IA2 vue cliniquement ou non
 - Lésion hypersignal T2 supérieure à 5 mm avec un liseré stromal en hyposignal T2 périphérique conservé tout autour de la tumeur

10 juin 2010

18

Bilan loco-régional: stade FIGO

- Stade I B1 de la FIGO : Carcinome strictement limité au col utérin

Bilan loco-régional: stade FIGO

- Stade I B1 de la FIGO : Carcinome strictement limité au col utérin

Bilan loco-régional: stade FIGO

- Stade II de la FIGO : Carcinome franchissant les limites du col

- Stade IIA : carcinome étendu au 1/3 supérieur du vagin sans extension au paramètre
 - Importance de l'utilisation de gel vaginal pour déplisser les parois vaginales.
- Stade IIB : carcinome étendu au paramètre, sans atteindre la paroi pelvienne

10 juin 2010

21

Bilan loco-régional: stade FIGO

- Stade IIA :

- comblement des culs de sac vaginaux
- interruption de l'hyposignal physiologique de la paroi vaginale
- épaissement hyperintense en contact avec la néoformation

- Fiabilité : 78 à 93%
- Sensibilité : 87 à 100%; Spécificité : plus faible
- Faux Positifs : cancers du col hypertrophiques bombant dans le vagin [Bartoli 1990],[Togashi 1989]; intérêt du gel+++

10 juin 2010

22

Bilan loco-régional: stade FIGO

- Stade IIA :

Bilan loco-régional: stade FIGO

- Stade IIB :

- Rupture de l'anneau fibreux en hyposignal pondéré T2 périphérique à la tumeur
- Infiltration latéralisée dans le plan coronal et axial transverse perpendiculaire au col

- Sensibilité IRM : 90%
- Spécificité IRM : 85%
- Fiabilité : 90%

10 juin 2010

24

Bilan loco-régional: stade FIGO

- [Stade IIB](#)

10 juin 2010

25

Bilan loco-régional: stade FIGO

- [Stade IIB avec atteinte ganglionnaire](#)

Bilan loco-régional: stade FIGO

- [Stade III de la FIGO](#) : Carcinome atteignant les 2/3 inférieurs du vagin et/ou la paroi pelvienne et/ou entraînant un retentissement sur le haut appareil urinaire
 - Stade IIIA : Carcinome étendu aux 2/3 inférieurs du vagin, sans atteindre la paroi pelvienne
 - Stade IIIB : Carcinome atteignant la paroi pelvienne et/ou s'accompagnant d'une hydronéphrose ou d'un rein non fonctionnel

10 juin 2010

27

Bilan loco-régional: stade FIGO

- [Stade IIIA](#)

Bilan loco-régional: stade FIGO

- [Stade IIIB](#) : extension au paramètre distal et aux structures musculo-ligamentaires du pelvis (en particulier, muscles obturateurs et pyramidaux) :
 - Hypertrophie et élévation du signal d'un ou de plusieurs muscles au contact d'une masse tumorale [Bartoli 1990]
 - Si interface grasseuse entre le muscle et la néoformation = intégrité musculaire
 - Sensibilité : 85% Spécificité : >95%
 - Fiabilité : 90 à 95% [Hricak 1988]
 - Faux Positifs : congestion musculaire œdémateuse secondaire au contact tumoral [Hricak 1988]

10 juin 2010

Bilan loco-régional: stade FIGO

- [Stade IV de la FIGO](#) : Carcinome étendu au-delà de l'appareil génital
 - Stade IVA : Carcinome étendu à la paroi vésicale ou rectale ou au delà de la cavité pelvienne
 - Stade IVB : Carcinome avec métastases

10 juin 2010

30

Bilan loco-régional: stade FIGO

- **Stade IVA** : Carcinome étendu à la paroi vésicale
 - semi-réplétion vésicale [Togashi 1989], séquence sagittale
 - Disparition du liseré graisseux inter-vésico-utérin
 - Interruption de l'hyposignal de la paroi vésicale en T2 par une zone d'hypersignal en prolongement avec l'hypersignal tumoral
 - prolongement nodulaire tumoral dans la lumière vésicale
 - Urétéro-hydronéphrose uni ou bilatérale
 - Sensibilité : 90 à 100% Spécificité : 80 à 96% selon les études [Bartoli 1990],[Togashi 1989], [Hricak 1988]
 - Fiabilité : 81 à 96%
 - Faux Positifs :
 - insuffisance de réplétion vésicale (épaississement de la paroi postérieure de la vessie)
 - petites images nodulaires endovésicales en

10 juin 2010

31

Bilan loco-régional: stade FIGO

- **Stade IVA** : Carcinome étendu à la paroi vésicale

Très volumineuse masse cervicale en hypersignal T2 avec disparition de la graisse inter-vésico-vaginale et extension également à la quasi totalité du vagin

Rétention intra cavitaire (hydrométrie)

7/15/39

32

Bilan loco-régional: stade FIGO

- **Stade IVA** : Carcinome étendu à la

10 juin 2010

Bilan loco-régional: stade FIGO

- **Stade IVA** : Carcinome étendu à la paroi rectale

- Moins fréquente que l'extension vésicale
- Epaississement de la paroi rectale ou recto-sigmoïdienne en hypersignal T2
- Protrusion nodulaire tumorale au sein de la lumière rectale
- simples compressions de la loge rectale

- Sensibilité > 90%
- Spécificité > 90
- Fiabilité > 92%
- Faux Positifs : effets de volume partiels (plan transversal, uterus antéversé)

10 juin 2010

34

BILAN GANGLIONNAIRE

- Préciser le pronostic et parfois les indications thérapeutiques
 - Facteur pronostique indépendant connu
 - En particulier dans les formes limitées des cancers du col utérin
 - Le nombre de ganglions atteints, le niveau supérieur de l'envahissement et la bilatéralité de l'atteinte ont également une valeur pronostique
- Les principales techniques d'imagerie utilisées sont:
 - le scanner
 - l'IRM

10 juin 2010

35

BILAN GANGLIONNAIRE

MASSE TISSULAIRE EN HYPERSIGNAL T2 DU COL UTERIN MESURANT 62 X31 X22 mm
ENVAHISSANT LE PARAMETRE : STADE II B
IRM ET TDM EN FAVEUR ADP SUSPECTES ILIAQUES EXTERNES BILATERALES (19 X 12 mm à G)

10 juin 2010

36

BILAN GANGLIONNAIRE

- Ces deux techniques mettent en évidence des ganglions augmentés de volume
- Impossibilité de préciser l'origine de cette augmentation : hyperplasie simple, ganglion inflammatoire, métastase
- Les performances de la TDM et de l'IRM paraissent équivalentes [HRICAK 1996] [SCHEIDLER1997]
- Intérêt de la séquence de diffusion (« scinti-IRM ») : augmente la sensibilité de la détection, mais n'augmente pas la spécificité.
- le TEP FDG permettrait de préciser le caractère pathologique des adénopathies

10 juin 2010

37

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- AUTRES HYPER-SIGNAUX T2 DU COL UTERIN
 - HYPERPLASIE GLANDULO-KYSTIQUE

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- AUTRES HYPER-SIGNAUX T2 DU COL UTERIN
 - KYSTE DE NABOTH

39

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- AUTRES HYPER-SIGNAUX T2 DU COL UTERIN
 - MYOME REMANIE

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- AUTRES HYPER-SIGNAUX T2 DU COL UTERIN
 - RETENTION PURULENTE OU HEMORRAGIQUE (CERVICITE)

41

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- AUTRES HYPER-SIGNAUX T2 DU COL UTERIN
 - POLYPE MUQUEUX
 - CAILLOT

10 juin 2010

42

DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

- LA PRINCIPALE CAUSE D'HYPERSIGNAL EN T2 DU COL UTERIN RESTE LE CANCER DU COL UTERIN
- La séquence en T2 sagittal est systématique en IRM chez la femme
- **TOUTE ANOMALIE ENDOCERVICALE A TYPE D'HYPERSIGNAL T2 DOIT ETRE SIGNALEE AU CORRESPONDANT**

10 juin 2010

43

SURVEILLANCE DES CANCERS DU COL TRAITES

- Quel que soit le traitement (chirurgie radicale ou radiothérapie ou association des deux) :
 - Problème pour la différenciation :
 - zones de fibrose
 - récurrences éventuelles
 - persistances tumorales

10 juin 2010

44

SURVEILLANCE DES CANCERS DU COL TRAITES

- Après traitement par radiothérapie exclusive ou par association radio-chimiothérapie
 - ☒ **involution utérine fréquente** secondaire à la castration radiothérapique

10 juin 2010

45

SURVEILLANCE DES CANCERS DU COL TRAITES

- Le signal tumoral, hyperintense en séquences pondérées en T2 est progressivement remplacé par une zone en hyposignal
- **La persistance d'un hypersignal localisé est un signe en faveur d'un résidu tumoral**

10 juin 2010

46

SURVEILLANCE DES CANCERS DU COL TRAITES

- **Stade IIB : JANVIER 2007**

10 juin 2010

47

SURVEILLANCE DES CANCERS DU COL TRAITES

- **Stade IIB : JUIN 2007** APRES FIN RADIO-CHIMIOTHERAPIE

DISPARITION DE L'HYPERSIGNAL T2 CERVICAL, LE COL PRESENTE A NOUVEAU UN ASPECT EN HYPOSIGNAL

10 juin 2010

48

Cas particulier : surveillance post trachélectomie

IRM post-conisation :
pas de lésion résiduelle visible

Surveillance post-trachelectomie :
Pas de lésion visible

10 juin 2010

Intérêt du gel à la recherche d'une récurrence locale +++

49

Cas particulier : cancer du col utérin post-conisation

10 juin 2010

Pas de syndrome de masse visualisé au niveau du col restant
mais envahissement du tiers supérieur du vagin : FIGO IIA
Intérêt du gel vaginal +++

50

SURVEILLANCE DES CANCERS DU COL TRAITES

- Après chirurgie, l'IRM est performante dans la mise en évidence des récurrences locales
- Elle permet :
 - de retrouver une formation suspecte
 - réaliser un nouveau bilan d'extension locorégional

10 juin 2010

51

SURVEILLANCE DES CANCERS DU COL TRAITES

- Le problème principal réside dans la différenciation fibrose (post-chirurgicale ou post-radique) et récurrence locale
- Fibroses récentes :
 - hypersignal en pondération T2 (lié à richesse en eau)
 - Diagnostic différentiel : récurrences localisées
 - Réhaussement après injection de gadolinium (comme récurrence)
- Fibroses anciennes :
 - signal proche de celui du muscle strié en T1
 - hypointense en pondération T2
 - Non réhaussées par l'injection de gadolinium (en fait réhaussement très tardif)
- Intérêt d'examens répétés après traitement
 - recherche de modifications des zones dont le signal est évocateur de fibrose

10 juin 2010

52

Cas Clin

- K col chez une femme enceinte

Stade I61

10 juin 2010

C

- Masse pelvienne

Récidive de mélanome vulvaire opéré

CONCLUSION

- **L'IRM** est particulièrement intéressante pour le bilan d'extension loco-régional, ganglionnaire (mais spécificité et sensibilité moyenne) et la définition des volumes cibles avant radiothérapie conformationnelle.
- **Le scanner** permet d'évaluer l'état ganglionnaire (de même manière que l'IRM) et la recherche de lésion métastatique à distance dans les formes loco-régionales avancées
- Enfin, **l'IRM** permet la surveillance des lésions sous traitement radio-chimiothérapeutique et la recherche de récurrences éventuelle

10 juin 2010

56